

Marbosan-100

Marbofloxacin 10% injection



*Traitement des infections respiratoires, des mastites
aiguës causées par des bactéries à Gram-négatif
chez les bovins et du syndrome de mastite-
métrite-agalactie chez les porcs.*

Marbosan-100

Solution pour voie parentérale

La marbofloxacin est un antimicrobien bactéricide appartenant au groupe des fluoroquinolones qui agit par inhibition de l'ADN gyrase. Elle a in vitro une activité à large spectre contre les bactéries à Gram-négatif (*Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*, *Histophilus somni*, *E. coli*) et contre les bactéries à Gram-positif (en particulier *Staphylococcus*). Une résistance contre *Streptococcus* peut apparaître. Les souches avec une CMI $\leq 1 \mu\text{g/ml}$ sont sensibles à la marbofloxacin tandis que les souches avec une CMI $\geq 4 \mu\text{g/ml}$ sont résistantes à la marbofloxacin.

CONTIENT PAR ML


Marbofloxacin 100 mg.

INDICATIONS

Bovins:


Traitement des infections respiratoires causées par les souches sensibles de *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*, *Histophilus somni* et *Mycoplasma bovis*.

Le produit est également indiqué pour le traitement des mastites aiguës causées par les bactéries à Gram-négatif sensibles à la marbofloxacin.



Porcs:

Traitement du syndrome métrite-mastite-agalaxie (syndrome de dysgalactie post-partum) causé par des souches bactériennes sensibles à la marbofloxacin.



POSOLOGIE

Bovins:

2 mg de marbofloxacin/kg de poids corporel (correspondant à 1 ml de Marbosan-100 pour 50 kg de poids corporel) en injection sous-cutanée ou intramusculaire une fois par jour pendant 3 - 5 jours. Le traitement pour la mastite aiguë est de 3 jours par voie intramusculaire. La première injection peut être administrée par voie intraveineuse.

Porcs:

2 mg de marbofloxacin/kg de poids corporel (correspondant à 1 ml de Marbosan-100 pour 50 kg de poids corporel) une fois par jour par injection intramusculaire pendant 3 jours.

WITHDRAWAL TIMES

Bovins:

- Viande et abats : 6 jours.
- Lait (traitement de 3 - 5 jours) : 36 heures.

Porcs:

- Viande et abats: 4 jours.

CONDITIONNEMENT

Fiole de 100 ml.



Produit par
Interchemie werken "De Adelaar" B.V.
Metaalweg 8, Venray, Pays-Bas

XFIMA10-FR-01-08092020