# Intercam-20

*Inyección de Meloxicam*

interchemie

*Para el tratamiento de infecciones respiratorias, diarrea, mastitis aguda, trastornos locomotores no infecciosos y trastornos musculoesqueléticos crónicos*

# Intercam-20

Solución para la administración por vía parenteral

**Meloxicam es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) perteneciente a la clase de los oxicam que actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, con lo que consigue efectos antiinflamatorios, antiexudativos, analgésicos y antipiréticos. Disminuye la infiltración de leucocitos al tejido inflamado. En menor medida, también inhibe la agregación de trombocitos inducida por colágeno. Aproximadamente el 50 % de la dosis administrada se elimina a través de la orina, y el resto en las heces.**

## CONTIENE POR ML

Meloxican..... 20 mg.

## INDICACIONES

Ganado bovino: para uso en infecciones respiratorias agudas junto con un tratamiento adecuado a base de antibióticos para reducir los signos clínicos en el ganado bovino. Para su uso en casos de diarrea en combinación con un tratamiento rehidratante oral con el fin de reducir los signos clínicos en terneros de más de una semana de edad y bovinos jóvenes no lactantes. Como terapia complementaria para el tratamiento de mastitis aguda, en combinación con terapia a base de antibióticos. Para el alivio del dolor posquirúrgico en terneros sometidos a descuerne.

Cerdos: para uso en trastornos locomotores no infecciosos con el objetivo de reducir los síntomas de cojera e inflamación. Como terapia complementaria en el tratamiento de la septicemia y toxemia puerperal (síndrome de mastitis-metritis-agalactia) junto con un tratamiento adecuado a base de antibióticos.

Caballos: para el uso del alivio de la inflamación y del dolor en trastornos musculoesqueléticos tanto agudos como crónicos. Para el alivio de dolor asociado con los cólicos equinos.

## POSOLOGÍA

Ganado bovino:
una única inyección subcutánea o intravenosa con una dosis de 0,5 mg/kg de peso (es decir, 2,5 ml/100 kg de peso) en combinación con tratamiento a base de antibióticos o de rehidratación oral, según sea apropiado.

Cerdos:
una única inyección intramuscular con una dosis de 0,4 mg/kg de peso (es decir, 2,0 ml/100 kg de peso) en combinación con tratamiento a base de antibióticos, según sea apropiado (la inyección puede repetirse después de 24 horas, en caso necesario).

Caballos:
una única inyección intravenosa con una dosis de 0,6 mg/kg de peso (es decir, 3,0 ml/100 kg de peso).

## TIEMPO DE ESPERA

| | | |
|---|---|---|
| Ganado bovino : | Carne y despojos | : 15 días. |
| | Leche | : 5 días. |
| Cerdos : | Carne y despojos | : 5 días. |
| Caballos : | Carne y despojos | : 5 días. |

Su uso no está autorizado en caballos que produzcan leche para consumo humano.

## ENVASADO

Frasco de 50 ml y 100 ml.

interchemie

sales@interchemie.com | interchemie.com

**Fabricado por**
Interchemie werken "De Adelaar" B.V.
Metaalweg 8, Venray, Países Bajos

XFIML2-ES-01-08092020